

哌甲酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_93_8C_E7_94_B2_E9_85_AF_c22_311742.htm 药品名称哌甲酯药物别名哌醋甲酯，利他林，RITALIN 英文名称Methylphenidate 类别抗抑郁症药性状常用其盐酸盐，为白色结晶性粉末；无臭。在水或甲醇中易溶，在乙醇中溶解，在氯仿中微溶，在丙酮中几乎不溶。制剂片剂：每片5mg；10mg、20mg；缓释片：每片20mg。注射剂：每支20mg（1ml）。分子式成分药理及应用为精神兴奋药。能提高精神活动，可对抗抑郁症。作用比苯丙胺弱，毒副作用亦较少。口服易吸收，1次服药作用可维持4小时左右。在体内迅速代谢，经尿排出。t_{1/2}30分钟。主要用于稍微脑功能失调（MBD）。国内曾用于治疗MBD241例，有效223例（92.53%）。用法用量口服，一次10mg，一日20~30mg。6岁以上儿童开始每次口服5mg，一日2次，于早饭及午饭前服。以后根据疗效调整剂量，每隔周递增5~10mg，一日总量不超过60mg。注重事项（1）不良反应与剂量有关。一般日量在30mg以内副作用很少。（2）最常见副作用为食欲减退；选用可口食物，加用健胃药可减轻此症状。经以上处理食欲减退仍十分严重者，应考虑减量。其他不良反应有口干、头晕、头痛、失眠、倦睡、运动障碍、恶心、神经质、皮疹、心律失常、心悸等。有些不良反应仅在服药初期出现，坚持服药可自动消失。可致依赖性。（3）6岁以下儿童，避免应用。（4）为了延缓耐药性的产生或减少副作用，在患儿不上学的日子（节假日）可以停药。但假如病情严重，不但影响学习，也影响其日常活动者，则应每日服药。傍晚以后宜避免服药，以免引起失眠。有人建

议：儿童食欲较好，较胖者可在饭前服药；食欲较差、较瘦小者可在饭后服药。（5）癫痫、高血压患者慎用。6岁以下儿童、严重焦虑、青光眼、激动、过度兴奋者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com