

塞利洛尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A1\\_9E\\_E5\\_88\\_A9\\_E6\\_B4\\_9B\\_E5\\_c22\\_311745.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_A1_9E_E5_88_A9_E6_B4_9B_E5_c22_311745.htm) 药品名称塞利洛尔 英文名称Celiprolol [ ] 类别 受体阻断药制剂片剂：200mg

药理及应用选择性阻断  $\beta_1$ 受体，具有内在拟交感活性，作用为普萘洛尔的0.3~1倍。尚有微弱的 $\alpha_2$ 受体阻断作用、正性肌力作用及直接舒张血管的作用用法用量用于高血压，心绞痛

，口服，1日1次，200~400mg注重事项（1）除对心脏的  $\beta_1$ 受体（ $\beta_1$ 受体）有阻断作用外，对支气管及血管平滑肌的  $\beta_2$ 受体（ $\beta_2$ 受体）亦有阻断作用，可引起支气管痉挛及鼻粘膜微

细血管收缩，故忌用于哮喘及过敏性鼻炎病人。（2）忌用于窦性心动过缓、重度房室传导阻滞、心源性休克、低血压症病人。充血性心力衰竭病人（继发于心动过速者除外），

须等心衰得到控制后始可用本品。不宜与抑制心脏的麻醉药（如乙醚）合用。（3）有增加洋地黄毒性的作用，对已洋地黄化而心脏高度扩大、心率又较不平稳的病人忌用。（4）

不宜与单胺氧化酶抑制剂（如帕吉林）合用。（5）本品剂量的个体差异较大，宜从小到大试用，以选择适宜的剂量。长期用药时不可忽然停药。（6）副作用可见乏力、嗜

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)