

依泮洛尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BE\\_9D\\_E6\\_B3\\_AE\\_E6\\_B4\\_9B\\_E5\\_c22\\_311753.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_BE_9D_E6_B3_AE_E6_B4_9B_E5_c22_311753.htm) 药品名称依泮洛尔药物别名VISACOR 英文名称Epanolol〔 〕类别 受体阻断药药理及应用选择性阻断 1受体具有内在拟交感活性用法用量用于轻度高血压，口服，1日1次，100~200mg，也可用于心绞痛注重事项（1）除对心脏的 受体（ 1受体）有阻断作用外，对支气管及血管平滑肌的 受体（ 2受体）亦有阻断作用，可引起支气管痉挛及鼻粘膜微细血管收缩，故忌用于哮喘及过敏性鼻炎病人。（2）忌用于窦性心动过缓、重度房室传导阻滞、心源性休克、低血压症病人。充血性心力衰竭病人（继发于心动过速者除外），须等心衰得到控制后始可用本品。不宜与抑制心脏的麻醉药（如乙醚）合用。（3）有增加洋地黄毒性的作用，对已洋地黄化而心脏高度扩大、心率又较不平稳的病人忌用。（4）不宜与单胺氧化酶抑制剂（如帕吉林）合用。（5）本品剂量的个体差异较大，宜从小到大试用，以选择适宜的剂量。长期用药时不可忽然停药。（6）副作用可见乏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)