

依拉地平 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_BE_9D_E6_8B_89_E5_9C_B0_E5_c22_311754.htm 药品名称依拉地平药物别名易拉地平，导脉顺，PN-200-110，COMIR，PRESCAL，DYNACIRC 英文名称Isradipine〔 〕类别钙拮抗药制剂片剂：每片2.5mg。缓释胶囊剂：每胶囊2.5mg；5mg。分子式成分药理及应用为二氢吡啶类钙拮抗药，对血管的选择性高，能舒张外周血管、冠状血管和脑血管，对心脏的作用较小，仅抑制窦房结的自发活动。可使血压下降，生效较慢（2~4周），持续时间较久。口服后吸收良好，由于首过效应明显，生物利用率仅17%。口服后血药浓度峰时间为2小时，在血浆中与蛋白的结合率为95%。在肝中代谢。t_{1/2}约9小时。用于高血压、冠心病和心绞痛，也可用于充血性心力衰竭。用法用量口服，1次2.5mg，1日2次；必要时可将剂量递增至1次5mg，1日2次。注重事项其不良反应主要是由于血管舒张所致的头痛、眩晕、心悸、面部潮红等。偶见肝功异常，且为时短暂。有时出现胃肠道不适等。主动脉狭窄、窦房结病综合征及低收缩压患者慎用。用于心绞痛时，勿忽然停药。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com