

酒石酸美托洛尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E9\\_85\\_92\\_E7\\_9F\\_B3\\_E9\\_85\\_B8\\_E7\\_c22\\_311762.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_85_92_E7_9F_B3_E9_85_B8_E7_c22_311762.htm) 药品名称酒石酸美托洛尔 药物别名倍他乐克，美多心安，美多洛尔 Betaloc，Iopressor 英文名称Metoprolol Tartrate#093. 类别 受体阻断药制剂片剂，缓释片：50mg、100mg；注射液：5ml：5mg。 药理毒理本品为 受体阻滞剂，有较弱的膜稳定作用，无内源性拟交感活性。对心脏的  $\beta_1$ -受体有较大的选择性作用。 药动学口服吸收完全， $T_{max}$  约1.5h，血压的降低与血药浓度不平行，而心率的减慢则与血药浓度呈直线关系。在肝内代谢，经肾排泄， $T_{1/2}$ 为3~4h，老年人延长至5h，肾功能不全时无明显改变。不能经透析排出。适应症心绞痛、高血压、肥厚性心肌病、室上性和室性快速心律失常等。 不良反应腹上区不适、倦怠或睡眠异常，眩晕及心动过速等，偶见非特异性皮肤反应和肢端发冷等。相互作用参见盐酸普萘洛尔用法用量口服，成人，25mg~50mg，2~3次/日，根据疗效可增至450mg/日，3次/日。静脉注射，2.5mg/次，最大量5mg，以1mg~2mg/min速度注入，根据需要及耐受程度5min后可重复一次，总量不超过10mg~15mg。 注重事项妊娠B类。其余参见盐酸普萘洛尔。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)