

盐酸氨溴索 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_B0_A8_E6_c22_311766.htm 药品名称盐酸氨溴索
药物别名溴环己胺醇、氨溴醇、沐舒坦、贝莱片、兰勃素 英文名称Ambroxol Hydrochloride 类别祛痰药制剂胶囊剂：75mg
。糖浆剂：30mg/5mL。注射剂：15mg/2mL。 药理毒理盐酸氨溴索具有促进粘液排除的作用及溶解分泌物的特性。它可促进呼吸道内粘液分泌物的排除，因而显著促进排痰，改善呼吸状况。应用本药治疗时，病人的粘液分泌可恢复至正常状况。咳嗽及痰量通常显著减少，呼吸道粘膜的表面活性剂能发挥其正常的保护功能。由于该药具有良好的耐受性，因此可长期使用。药动学口服吸收良好，生物利用度为70%， T_{max} 约2h， $T_{1/2}$ 为7.5h，作用约持续10h，主要经肝脏代谢。适应症伴有呼吸道异常分泌的急慢性支气管炎、喘息性支气管炎和支气管哮喘。不良反应恶心、呕吐等胃肠道反应。相互作用与抗生素如阿莫西林、头孢呋新、红霉素、强力霉素同时使用，可导致抗生素在肺组织浓度升高。用法用量缓释剂口服：75mg/次，1次/日。片剂：成人每次30 mg，每日3次，严重者可增至60 mg/次，每日2次，餐后以液体送服。糖浆：成人及12岁以上的儿童：10 mL/次，每日2次；6-12岁的儿童：5 mL/次，每日2-3次；2-6岁儿童：2.5 mL/次，每日3次；1-2岁儿童：2.5 mL/次，每日2次。此为初始剂量，14天后剂量可减半。服药时应在餐后以液体送服。针剂预防治疗：成人1安瓿，每日2-3次缓慢静脉注射，重者可增至每次2安瓿；6岁以上儿童1安瓿，每日2-3次；2-6岁儿童 $\frac{1}{2}$ 安瓿，每日3次；2岁以下儿童 $\frac{1}{4}$ 安瓿，每日2次。婴儿呼吸窘迫综合征

30 mg/kg/日，分4次给药，静脉输注时间至少5分钟。注重事项胃溃疡患者及哺乳期妇女慎用。对妊娠和哺乳的影响：临床前试验及用药28周后的大量临床经验显示，对妊娠没有不良影响。但妊娠期间，尤其是妊娠前三个月应慎用药物。药物可进入乳汁，但治疗剂量对婴儿无影响。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com