

肼屈嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_E8\\_82\\_BC\\_E5\\_B1\\_88\\_E5\\_97\\_AA\\_c22\\_311771.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022_E8_82_BC_E5_B1_88_E5_97_AA_c22_311771.htm) 药品名称肼屈嗪药物别名（肼苯过嗪，肼酞嗪，APRESOLINE）英文名

称Hydralazine 类别降血压药性状常用其盐酸盐，为白色或淡黄色结晶性粉末；无臭。在水中溶解，在乙醇中微溶，在乙醚中极微溶解制剂片剂：每片10mg；25mg；50mg。缓释片：每片50mg。注射液：每支20mg（1ml）。分子式成分药理及应用具有中等强度的降血压作用，其特点为：舒张压下降较显著，并能增加肾血流量。其降压作用于用药后30～40分钟开始出现。降压作用主要是使小动脉扩张，外周总阻力降低，以致血压下降。现多用于肾型高血压及舒张压较高的病人。单独使用效果不甚好，且易引起副作用，故多与利血平、氢氯噻嗪、胍乙啶或普萘洛尔合用以增加疗效。用法用量口服或静注、肌注。一般开始时用小量，每日3～4次，每次10mg，用药2～4日。以后用量逐渐增加。维持量，1日30～200mg，分次服用。注意事项口服或静注、肌注。一般开始时用小量，每日3～4次，每次10mg，用药2～4日。以后用量逐渐增加。维持量，1日30～200mg，分次服用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)