

非洛地平 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_9D_9E_E6_B4_9B_E5_9C_B0_E5_c22_311774.htm 药品名称非洛地平药物别名费乐地平，二氯苯吡啶 英文名称Felodipine〔 〕类别钙拮抗药分子式成分药理及应用作用与硝苯地平相似，对冠脉及外周血管均有扩张作用；高浓度时兼有抑制钙调素从而干扰细胞内钙的利用。可增加冠状窦血流量，降低全身及冠脉血管阻力，使血压下降。口服后吸收完全，在血浆中与蛋白的结合率为99%，在体内由肝灭活。t_{1/2}约25小时。适应症用于高血压病、缺血性心脏病和心力衰竭患者。用法用量一日剂量20mg，分次服。常用量时不良反应较轻。大剂量时可出现头晕、头痛、心悸、疲乏等不良反应。也可发生齿龈增生或踝关节肿胀。动物研究表明可损伤胚胎，孕妇慎用。与地高辛合用时可增加后者的血药浓度，应注重减量。与肝药酶抑制剂合用时可使费乐地平血药浓度增加；反之与肝药酶诱导剂合用时则其血浓度降低。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com