

米诺地尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022_E7_B1_B3_E8_AF_BA_E5_9C_B0_E5_c22_311777.htm 药品名称米诺地尔
药物别名（长压定，敏乐啶，LONITEN）英文名称Minoxidil
类别降血压药制剂片剂：2.5mg、5mg、10mg。分子式成分药
动学口服吸收良好，t_{max}约1h，约1.5h起效，2h～3h达高峰
，可持续75h。主要在肝代谢，经肾排出。t_{1/2}约4h。适应症
中、重度高血压。亦局部用于男性斑秃。不良反应可致水钠
潴留下肢水肿、心率加快、心律失常、皮肤潮红、心绞痛、
头痛、眩晕等。毛发增生以脸、臂及背部较显著。相互作用
阻滞剂等其它降压药、利尿药可增强本品作用，合用胍乙
啶可致严重竖立性低血压。非甾体消炎镇痛药、拟交感胺类
药可减弱本品作用。用法用量口服，成人及12岁以上儿童
，2.5mg～5mg/次，1次/日，每3日渐增，常用量10mg～40mg/
日，不宜超过100mg/日。儿童，0.1mg～0.2mg/kg，1次/日，
最大5mg/日，每3日渐增，常用量每日0.25mg～1mg/kg，不宜超
过50mg/日。男性斑秃，局部涂抹，每日2次，约4个月可见效。
。注意事项妊娠C类。妊娠、哺乳期妇女慎用。宜逐步停药。
。嗜铬细胞瘤患者禁用。脑血管病、肺原性心脏病、心绞痛
、心肌梗死、慢性充血性心力衰竭、严重肝肾功能不全患者
慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com