

妥拉洛尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_A6_A5_E6_8B_89_E6_B4_9B_E5_c22_311781.htm

药品名称妥拉洛尔
物别名胺甲苯心安，TOLAMIDOL 英文名称Tolarnolol〔 〕

类别 受体阻断药
药理及应用 选择性阻断 β_1 受体，无内在拟交感活性，作用强度与普萘洛尔相似
用法用量 用于高血压、心绞痛。口服50~100mg/次，1日3次

注重事项 (1) 除对心脏的 β_1 受体 (β_1 受体) 有阻断作用外，对支气管及血管平滑肌的 β_2 受体 (β_2 受体) 亦有阻断作用，可引起支气管痉挛及鼻粘膜微细血管收缩，故忌用于哮喘及过敏性鼻炎病人。(2)

忌用于窦性心动过缓、重度房室传导阻滞、心源性休克、低血压症病人。充血性心力衰竭病人 (继发于心动过速者除外) ，须等心衰得到控制后始可用本品。不宜与抑制心脏的麻醉药 (如乙醚) 合用。(3)

有增加洋地黄毒性的作用，对已洋地黄化而心脏高度扩大、心率又较不平稳的病人忌用。(4)

不宜与单胺氧化酶抑制剂 (如帕吉林) 合用。(5) 本品剂量的个体差异较大，宜从小到大试用，以选择适宜的剂量。长期用药时不可忽然停药。(6)

副作用可见乏力、嗜睡、头晕、失眠、恶心、腹胀、皮疹、晕厥、低血压、心动过缓等，须注重。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com