

二氮嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_BA_8C_E6_B0_AE_E5_97_AA_c22_311783.htm 药品名称二氮嗪药物别名

(降压嗪，氯甲苯噻嗪，HYPERSTAT) 英文名

称Diazoxide〔 〕 类别降血压药制剂注射用二氮嗪：每

支300mg，附专用溶剂20ml。分子式成分药理及应用能松弛血

管平滑肌，降低四周血管阻力，使血压急剧下降。一次快速

静注本品300mg，可在5分钟内出现降压高峰，使血压降至正

常水平，并可维持2~18小时或更长一些。在降压的同时，并

不降低心输出量，故脑、肾、冠脉的血流量不变。适用于高

血压危象的急救。还能抑制胰脏 细胞分泌胰岛素，可用作

升血糖药，用于幼儿特发性低血糖症、由于胰岛细胞瘤引起的

严重低血糖。用法用量临用时将本品溶于专用溶剂内，患

者取卧位快速静注。症状缓解后再改以口服降压药维持。快

速静注，1次200~400mg，在15~20秒钟内注完。抢救高血压

危象时，可在0.5~3小时内再注射1次，1日总量不超过1200mg

。儿童剂量：5mg/kg。注重事项(1)可引起水钠潴留，多

次重复使用可能引起水肿、充血性心力衰竭，过量可引起低

血压症甚至导致休克，均应及时予以处理。(2)对糖尿病

患者或多次注射本品的患者，为防止血糖上升，可用胰岛素

或口服降血糖药以控制血糖。(3)用药后可能出现一时性

脑或心肌缺血、发热感、头痛、恶心、失眠、便秘、腹部不

适感、听觉异常、静脉灼痛感等。(4)充血性心力衰竭、

糖尿病、肾功能不全的重型高血压患者及乳妇忌用。(5)

本品不宜与其他药物及输液配伍。100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com