

哌唑嗪〔典〕〔基〕PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_93_8C_E5_94_91_E5_97_AA_E3_c22_311787.htm 药品名称哌唑嗪〔典〕〔基〕

药物别名（脉宁平，Furazosin，HYPOVASE，MINIPRESS）英文名称Prazosin 类别降血压药性状常用其盐酸盐，为白色或类白色结晶性粉末；无臭，无味。在乙醇中微溶，在水中几乎不溶。制剂片剂：每片0.5mg；1mg；2mg；5mg。分子式成分药理及应用为选择性突触后 α_1 受体阻滞剂，能松弛血管平滑肌，产生降压效应。它不影响 α_2 受体，不会引起明显的反射性心动过速，也不增加肾素的分泌。口服吸收良好，半小时起效，经1~2小时血浓度达高峰， $t_{1/2}$ 为22~3小时，作用可持续6~10小时。适用于治疗轻、中度高血压，常与 α_2 受体阻滞剂或利尿剂合用，降压效果更好。由于本品既能扩张容量血管，降低前负荷，又能扩张阻力血管，降低后负荷，可用于治疗中、重度慢性充血性心力衰竭及心肌梗塞后心力衰竭。对常规疗法（洋地黄、利尿剂）无效或效果不显著的心力衰竭患者也有效。用法用量口服：开始每次0.5~1mg，1日1.5~3mg，以后逐渐增至1日6~15mg，分次服用。对充血性心力衰竭，维持量通常为每日4~20mg，分次服用。注重事项（1）初服时可有恶心、眩晕、头痛、嗜睡、心悸、体位性低血压，称为首剂现象，可于睡前服用或自0.5mg开始服用以避免之。（2）偶有口干、皮疹、发热性多关节炎等。（3）严重心脏病、精神病患者慎用。（4）过敏者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com