

乌拉地尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B9\\_8C\\_E6\\_8B\\_89\\_E5\\_9C\\_B0\\_E5\\_c22\\_311797.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_B9_8C_E6_8B_89_E5_9C_B0_E5_c22_311797.htm) 药品名称乌拉地尔  
物别名（优匹敌，Eupressyl，EBRANTIL）英文名称Urapidil  
〔 〕类别降血压药制剂缓释胶囊剂：每胶囊30mg，60mg。  
注射液：每支25mg / 5ml；50mg（10ml）。分子式成分药理  
及应用本品的化学结构与哌唑嗪并不相似，它具有阻断突触后  
1受体的作用和阻断外周 2受体的作用，但以前者为主。  
此外，它尚有激活中枢5-羟色胺-1A受体的作用，可降低延  
脑心血管调节中枢的交感反馈而起到降低血压。本品对静脉  
的舒张作用大于对动脉的作用，在降压时并不影响颅内血压。  
本品尚可降低心脏前后负荷和平均肺动脉压，改善心搏出  
量和心输出量，降低肾血管阻力，对心率无明显影响。口服  
本品缓释胶囊后，生物利用度为72%。与血浆蛋白结合率  
约80%。主要在肝内代谢，部分代谢产物仍可能有降压活性。  
t<sub>1/2</sub>约5小时。常用于各类型的高血压（口服）可与利尿  
降压药、 阻断药合用；也用于高血压危象及手术前、中、  
后对高血压升高的控制性降压（静脉注射）。用法用量口服  
：开始时1次60mg，早晚各服1次，如血压逐渐下降，可减量  
为30mg / 次。维持量1日30～180mg。静脉注射：一般剂量  
为25～50mg，如用50mg，应分2次给药，其间隔为5分钟。静  
脉滴注：将250mg溶于输液500ml中，开始滴速为6mg / 分，  
维持剂量滴速平均为120mg / 小时。注重事项（1）不良反应  
较少，偶见头痛、头晕、恶心、疲乏、心悸、心律失常、瘙  
痒、失眠等。体位性低血压较哌唑嗪少，无首剂反应。（2  
）孕妇、哺乳期妇女禁用。主动脉峡部狭窄或动静脉分流的

患者禁用静脉注射。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)