

硝苯地平 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_9D\\_E8\\_8B\\_AF\\_E5\\_9C\\_B0\\_E5\\_c22\\_311798.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_A1_9D_E8_8B_AF_E5_9C_B0_E5_c22_311798.htm) 药品名称硝苯地平药

物别名硝苯吡啶，心痛定，利心平，ADALAT，Bay a 1040

，NIFELAT 英文名称Nifedipine 类别钙拮抗药性状黄色结晶性粉末；无臭，无味，遇光不稳定。在丙酮或氯仿中易溶，在乙醇中略溶，在水中几乎不溶。熔点171~175℃。制剂片剂

：每片5mg；10mg。控释片：每片20mg。胶丸剂：每丸5mg

。胶囊剂：每胶囊5mg；10mg。喷雾剂：每瓶100mg。分子式

成分药理及应用具有抑制Ca<sup>2+</sup>内流作用，能松弛血管平滑肌

，扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，提高心肌对缺血的耐受性

，同时能扩张四周小动脉，降低外周血管阻力，从而使血压下降

。小剂量扩张冠状动脉时并不影响血压，为较好的抗心绞痛药

。用作抗高血压药，没有一般血管扩张剂常有的水钠潴留和浮肿等不良反应

。口服吸收良好，经10分钟生效，1~2小时达最大效应，作用维持6~7小时

。舌下含服作用较口服迅速。喷雾给药10分钟即现降压作用，经1小时疗效最显著

，约3小时后血压回升（个别可持续11小时）。静注10分钟内可降低血压21%~26%

。临床适用于预防和治疗冠心病心绞痛，非凡是变异型心绞痛和冠状动脉痉挛所致心绞痛

。对呼吸功能没有不良影响，故适用于患有呼吸道阻塞性疾病的心绞痛病人

，其疗效优于β受体阻滞剂。还适用于各种类型的高血压，对顽固性、重度高血压也有较好疗效

。由于能降低后负荷，对顽固性充血性心力衰竭亦有良好疗效，宜于长期服用

。贮存遮光，密封保存。用法用量口服：1次5~10mg，1日15~30mg

。急用时可舌下含服。对慢性心力衰竭，每6小

时20mg。咽部喷药：每次1.5~2mg（约喷3~4下）。注重事项（1）不良反应一般较轻，初服者常见面部潮红，其次有心悸、窦性心动过速。个别有舌根麻木、口干、发汗、头痛、恶心、食欲不振等。（2）低血压患者慎用；孕妇禁用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)