

苯丙哌林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_8B_AF_E4_B8_99_E5_93_8C_E6_c22_311799.htm 药品名称苯丙哌林药物别名咳快好，咳哌宁，苯哌丙烷 英文名称Benproperine 类别镇咳药性状常用其磷酸盐，为白色或几乎白色粉末；微带特臭，味苦。熔点148~153 在水中易溶，在乙醇、氯仿或苯中略溶，在乙醚或丙酮中不溶。制剂片（胶囊）剂：每片（胶囊）20mg。口服液：每10ml含10mg；20mg。冲剂：每袋20mg。分子式成分药理及应用本品为非麻醉性镇咳剂，具有较强镇咳作用，药理研究结果证实，狗口服或静注本品2mg/kg可完全抑制多种刺激引起的咳嗽，其作用较可待因强2~4倍。本品除抑制咳嗽中枢外，尚可阻断肺—胸膜的牵张感受器产生的肺—迷走神经反射，并具有罂粟硷样平滑肌解痉作用，故其镇咳作用兼具中枢性和末梢性双重机制。本品口服易吸收，服后15~20分钟即生效，镇咳作用可持续4~7小时。本品不抑制呼吸，不引起胆道及十二指肠痉挛或收缩，不引起便秘，未发现耐受性及成瘾性。用于治疗急性支气管炎及各种原因如感染、吸烟、刺激物、过敏等引起的咳嗽，对刺激性干咳效佳。有报道本品的镇咳疗效优于磷酸可待因。贮存密闭、避光保存。用法用量成人，口服，每次20~40mg，1日60~120mg。也可根据病情决定。注重事项（1）偶见口干、胃部烧灼感、食欲不振、乏力、头晕和药疹等不良反应。（2）对本品过敏者禁用。（3）服用时需整片吞服，切勿嚼碎，以免引起口腔麻木。（4）孕妇应在医师指导下应用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com