

去乙酰毛花甙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_8E_BB_E4_B9_99_E9_85_B0_E6_c22_311809.htm 药品名称去乙酰毛花甙
药物别名毛花强心丙，西地兰D，CEDILANID D

，DEACETYLDIGILANID C 英文名称Deslanoside 类别治疗慢性心功能不全的药物性状白色结晶性粉末；无臭，味苦；有引湿性。在甲醇中微溶，在乙醇中极微溶解，在水或氯仿中几乎不溶。制剂注射液：每支0.2mg（1ml）；0.4mg（2ml）。药理及应用为毛花甙丙的脱乙酰基衍生物，其药理性质与毛花甙丙相同，但比较稳定，作用迅速，常以注射给药用于快速饱和，继后用其他慢速、中速类强心甙作维持治疗。本品静注经5～30分钟生效，1～2小时达最大效应， $t_{1/2}$ 3小时。3～6日作用完全消失。临床适用于急性心力衰竭及心房颤动、扑动等。贮存避光保存。用法用量静注1次0.4～0.8mg，用葡萄糖注射液稀释后缓慢注射。全效量1～1.6mg，于24小时内分次注射。儿童每日20～40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ，分1～2次给药。然后改用口服毛花甙丙维持治疗。注重事项可有恶心、呕吐、食欲不振、头痛、心动过缓等。禁与钙注射剂合用。严重心肌损害及肾功能不全者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com