

莫索尼定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8E\\_AB\\_E7\\_B4\\_A2\\_E5\\_B0\\_BC\\_E5\\_c22\\_311816.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_8E_AB_E7_B4_A2_E5_B0_BC_E5_c22_311816.htm) 药品名称莫索尼定  
英文名称Moxonidine〔 〕 类别降血压药制剂片剂：每  
片0.2mg。0.4mg。药理及应用可激动中枢  $\alpha_2$ 受体而引起降压  
作用，类似可乐定。口服吸收率（90%）及生物利用度（88  
%）均高，无首过效应。峰血药浓度出现于服药后1~3小时  
。大部分由肾排泄。 $t_{1/2}$ 约2小时。临床多用于高血压用法  
用量口服：1日1次0.2~0.4mg，最大日剂量0.6mg。注重事项  
（1）治疗开始时可出现口干、疲乏和头痛，但比可乐定者少  
；偶见头晕、失眠和腿酸软等。（2）病态窦房结综合征、  
窦房结和房室 ~ 度传导阻滞、安静时心动过缓（50次 /  
分以下）、非稳定型心绞痛、严重肝病、进行性肾功能障碍  
、血管神经性水肿患者禁用。100Test 下载频道开通，各类考  
试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)