

盐酸丙咪嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E4\\_B8\\_99\\_E5\\_c22\\_311843.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E4_B8_99_E5_c22_311843.htm) 药品名称盐酸丙咪嗪药物别名米帕明 Imizine，Tofranil 英文名

称ImipramineHydrochloride 类别抗抑郁症药制剂片剂：10mg、25mg、50mg；糖浆剂：25mg；注射液：11.5mg、23mg。

药理毒理有较强的抗抑郁作用，但兴奋作用不明显，镇静作用弱、对内源性忧郁症，反应性抑郁症及更年期抑郁症均有效，但疗效慢，对精神分裂症伴发的抑郁状态无效，也可用于小儿遗尿症。药动学口服易吸收，PB为76%~95%，T<sub>1/2</sub>为6~20h，主要经肾脏排泄适应症内因性抑郁症。也用于儿童遗尿症。不良反应参见阿米替林。偶见皮疹、皮肤光敏反应、心血管系统异常等。相互作用参见阿米替林。与抗胆碱药物或抗精神病药物合用时易引起尿潴留、麻痹性肠梗阻及意识障碍，老年患者较易发生且程度较重。用法用量抑郁症：25mg/次，3次/日，渐增至50mg/次，不宜超过250mg/日；青少年和老年人可开始睡前服10mg，渐增至10~25mg/次，3次/日；口服困难者，可肌内注射给药。遗尿：6~7岁25mg；8~11岁25~50mg/次；11岁以上50~75mg次，睡前服，疗程不超过3个月。注重事项参见阿米替林。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)