

洋地黄毒甙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B4_8B_E5_9C_B0_E9_BB_84_E6_c22_311849.htm 药品名称洋地黄毒甙
药物别名狄吉妥辛，DIGOTIN 英文名称Digitoxin 类别治疗慢性心功能不全的药物性状白色或类白色的结晶粉末；无臭。熔点256 ~ 257 。在氯仿中略溶，在乙醇或乙醚中微溶，在水中不溶。制剂片剂：每片0.1mg。注射液：每支0.2mg（1ml）。分子式成分药理及应用本品为洋地黄的提纯制剂，其效价约为洋地黄的1000倍，故用量仅约为洋地黄的1 / 1000。口服几乎能完全吸收，经2 ~ 4小时起效，8 ~ 12小时达最大效应，作用维持2 ~ 3周。静注经0.5小时见效，4 ~ 8小时达最大效应。由于有较大蓄积作用，可能引起洋地黄中毒。临床主要用于维持治疗慢性心功能不全。相互作用同时服用苯妥英钠、苯巴比妥、保泰松、利福平，会使血中洋地黄毒甙浓度降低50%。贮存避光密闭保存。用法用量主要采用口服，不宜口服者可以肌注，必要时静注。全效量：成人0.7 ~ 1.2mg；于48 ~ 72小时内分次服用。小儿2岁以下0.03 ~ 0.04mg / kg，2岁以上0.02 ~ 0.03mg / kg。维持量：成人每日0.05 ~ 0.1mg；小儿为全效量的1 / 10，每日1次。注重事项可有恶心、呕吐、黄视等。不可与酸、碱类配伍。其余参见洋地黄。禁与钙注射剂合用。严重心肌损害及肾功能不全者慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com