

甲地高辛 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_94_B2_E5_9C_B0_E9_AB_98_E8_c22_311853.htm 药品名称甲地高辛药物别名甲基狄戈辛，Medigoxin，-Methyldigoxin，DIGICOR，LANITOP 英文名称Metildigoxin 类别治疗慢性心功能不全的药物性状白色或类白色结晶性粉末；无臭，味苦。在氯仿中略溶，在甲醇、乙醇中极微溶解，在水中几乎不溶。制剂片剂：每片0.1mg。注射液：每支0.2mg（2ml）。分子式成分药理及应用强心作用比地高辛强，其0.3mg的效应与0.5mg地高辛者同，并具有口服吸收好、起效迅速和安全性高等优点。口服从胃肠道吸收迅速而完全，吸收率高达91%~95%，且吸收规则。服后10~20分钟生效，30~40分钟达最高血浓度，约1小时达最大效应；静注经1~2分钟生效。作用完全消失时间为6天。其排泄速度也较地高辛快，大部分以原形和代谢物于7天内从尿中排出。临床适用于急性和慢性心力衰竭。用法用量口服或静注：1次0.1~0.2mg，1日2~3次，2~3天后改用维持量；维持量：口服1次0.05~0.1mg，1日2次；静注每日0.2~0.3mg。注重事项一般无明显不良反应，个别有恶心、呕吐、头昏等。肝、肾功能不全者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com