

双胍屈嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_8F_8C_E8_82_BC_E5_B1_88_E5_c22_311870.htm 药品名称双胍屈嗪
物别名（双胍苯达嗪，双胍酞嗪，血压过静，NEPRESOL）
英文名称Dihydralazine 类别降血压药性状常用其硫酸盐，为白色或微黄色结晶性粉末，无水物为黄色粉末；无臭，味微苦。在沸水中略溶，在水中或乙醇中微溶。制剂片剂：每片12.5mg；25mg。注射用双胍屈嗪：25mg。安速降压片：每片含本品4mg，普萘洛尔10mg、呋塞米（速尿）5mg、黄豆甙元25mg，以及氯氮（利眠宁）、氯化钾、维生素B1、维生素B6、三硅酸镁等。用于各期原发性高血压及合并冠心病的高血压，也可用于肾性高血压。成人每次2片，1日3次。待血压降下后，可酌情减至每日1次。服药后偶有口干、思睡、胃部不适、稀便等副作用，但一般毋需停药。哮喘、心功能不全、房室传导阻滞、心动过缓、急性心肌梗塞等患者忌用，慢性气管炎患者慎用。分子式成分药理及应用与胍屈嗪作用相似，但较缓慢、持久。用途同胍屈嗪。与其他降压药合用效果较好。用法用量口服：1次12.5～25mg，1日25～50mg。发生耐受性后，可加大到每次50mg，1日3次。注重事项（1）服后可出现头痛、头胀、脚软，有时可见面部发热、胃部不适、食欲减退、心悸以及恶心、体位性低血压等，但较胍屈嗪轻。（2）长期使用大剂量时（每次用50mg），可产生类风湿性关节炎乃至红斑性狼疮，必须立即停药，并用皮质激素治疗。（3）宜与利血平或氯噻嗪类药物合用，可降低利血平等的用量，并可避免引起对本品的耐受性。亦可与阻断剂合用，对降压起协同作用，并能互相抵消副作用。（4

) 冠心病、脑动脉硬化及心动过速者禁用。 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com