

毛花甙丙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_AF\\_9B\\_E8\\_8A\\_B1\\_E7\\_94\\_99\\_E4\\_c22\\_311894.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_AF_9B_E8_8A_B1_E7_94_99_E4_c22_311894.htm) 药品名称毛花甙丙药物别名毛花洋地黄甙，西地兰，CEDILANID，DIGILANID C 英文名称Lanatoside〔 〕类别治疗慢性心功能不全的药物性状白色结晶性粉末，有吸湿性，无臭，熔点240（分解）。不溶于水，略溶于乙醇，易溶于甲醇、二氧六环、吡啶。制剂片剂：每片0.5mg。注射液：每支0.4mg（2ml）分子式成分药理及应用由毛花洋地黄中提出的一种速效强心甙，其作用较洋地黄、地高辛快，但比毒毛花甙K稍慢。口服经2小时见效，作用维持3~6天；静注开始作用为5~30分钟，作用维持2~4天。由于排泄较快，蓄积性较小。临床用于急性和慢性心力衰竭、心房颤抖和阵发性室上性心动过速。由于本品在溶液中不如去乙酸毛花甙稳定，故注射多采用后者，本品仅有时用于口服给药；因从胃肠道吸收不如洋地黄毒甙，且吸收不规则，现口服亦少用。贮存避光密闭保存。用法用量缓慢全效量：口服：1次0.5mg，1日4次。维持量：一般为1日1mg，2次分服。静脉注射：成人常用量，全效量1~1.2mg，首次剂量0.4~0.6mg；2~4小时后可再给予0.2~0.4mg，用葡萄糖注射液稀释后缓慢注射。注重事项过量时可有恶心、食欲不振、头痛、心动过缓、黄视等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)