

倍他洛尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E5\\_80\\_8D\\_E4\\_BB\\_96\\_E6\\_B4\\_9B\\_E5\\_c22\\_311896.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_80_8D_E4_BB_96_E6_B4_9B_E5_c22_311896.htm) 药品名称倍他洛尔 英文名称Betaxolol [ ] 类别 受体阻断药制剂常用其片剂，每片20mg；滴眼剂：0.25%；0.5%；1%。药理及应用本品为选择性  $\beta_1$ 受体阻断药，无内在拟交感活性，具有一定的膜稳定作用。作用类似阿替洛尔。口服后吸收完全，首过效应少，生物利用度为80%~90%。与血浆蛋白结合率为50%。主要消除途径为经肝代谢和不良反应其不良反应及注重事项同阿替洛尔。用法用量主要用于高血压，一般口服，1日1次20mg，（亦可自1日1次10mg开始），通常在7~14日达到良效，如需要也可增加剂量1日1次40mg。老年患者开始剂量宜酌减。亦用于开角型青光眼，以0.5%溶液滴眼，1日2次。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)