

毒毛花甙K PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_AF\\_92\\_E6\\_AF\\_9B\\_E8\\_8A\\_B1\\_E7\\_c22\\_311899.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_AF_92_E6_AF_9B_E8_8A_B1_E7_c22_311899.htm) 药品名称毒毛花甙K

药物别名毒毛旋花子甙K，毒毛甙K，Strophantink，Strofan-K

英文名称Strophanthin K 类别治疗慢性心功能不全的药物性状

白色或淡黄色粉末，溶于水、乙醇、微溶于氯仿，不溶于乙

醚。在碱性溶液中易分解。制剂注射液：每支0.25mg（1ml）

。药理及应用本品为常用的速效强心甙。其口服不易吸收，

且吸收不规则；静注作用较毛花甙丙、地高辛快，排泄亦快

，蓄积作用小。静注经5～15分钟生效，1～2小时达最大效应

，作用维持1～4天。临床适用于急性心力衰竭。动脉硬化性

心脏病患者发生心力衰竭时，如心率不快，可选用本品。说明

由夹竹桃科植物绿毒毛旋花（Strophanthus Kombe）的种子

中提出的各种甙的混合物。用法用量静注：首剂0.125

～0.25mg，加入等渗葡萄糖液20～40ml内缓慢注入（时间不

少于5分钟），1～2小时后重复1次，总量天天0.25～0.5mg。

病情转好后，可改用洋地黄口服制剂，给予适当的全效量。

小儿每次静注0.007～0.01mg/kg。注重事项近1～2周内用过

洋地黄制剂者，不宜应用，以免中毒危险。不宜与碱性溶液

配伍。其余见洋地黄。100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)