

三甲硫苯嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_89\\_E7\\_94\\_B2\\_E7\\_A1\\_AB\\_E8\\_c22\\_311902.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_B8_89_E7_94_B2_E7_A1_AB_E8_c22_311902.htm) 药品名称三甲硫苯嗪  
药物别名溃疡愈康，溃消净，ISF-2001 英文名称iritiozine 类别  
抗酸药及治疗消化性溃疡病药性状为淡黄色结晶或结晶性粉末，无臭，味苦。熔点140~141。在水中极微溶解，饱和水溶液pH为7；溶解于丙酮，在乙醇、氯仿中易溶。本品对空气、潮湿环境及光稳定。制剂胶囊剂：每胶囊150mg。分子式成分药理及应用药理试验表明，本品具有抗胃酸分泌的活性，有明显促进溃疡愈合的作用，并能使胃平滑肌张力降低，使肠平滑肌张力明显降低、蠕动减弱；并有中等程度的镇静作用，但无抗胆碱、抗组胺或神经节阻断作用。本品对消化性溃疡所引起的疼痛有良效，临床适用于治疗胃和十二指肠溃疡、分泌过多性胃炎及十二指肠炎、弥漫性胃粘膜糜烂等。有效率80%左右。贮存密闭凉暗处贮存。用法用量口服：每次300mg，每日3次，4周为1疗程。注重事项（1）副作用和不良反应发生率低于2%，一般有口干、嗜睡、头晕等，少数病例有手指发麻、肌痛、胃灼热感、氨基转移酶升高等不良反应，但停药后短期内可恢复正常。（2）对过敏及不能耐受的患者应立即停药；高空作业及各类驾驶人员慎用，孕妇及肝炎患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)