

胍那苳 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_83_8D_E9_82_A3_E8_8B_84_c22_311914.htm 药品名称胍那苳药物别名（氯苳氨胍）英文名称Guanabenz〔 〕类别降血压药分子式成分药理及应用为中枢性 α_2 受体激动剂，此外，尚具有类似胍乙啶的抑制去甲肾上腺素释放的外周性作用。它具有良好的降压作用，总外周阻力下降，但对心功能无显著影响，不改变心搏出量、心输出量及肾小球滤过率。口服后吸收良好，3小时后血药浓度达峰值。在血浆中与蛋白的结合率为90%，经过肝脏的首过效应较明显。 $t_{1/2}$ 为12~14小时。适应症用于轻度及中度高血压患者。不良反应常见的不良反应同可乐定，但较少见。少数患者在长期用药忽然停药时也可产生撤药症状。用法用量日剂量为8~64mg。一般初用剂量每次4mg，1日2次。每1~2周增加4~8mg，最大达64mg。也可用于较重的高血压患者，宜与利尿药合用。其片剂为4mg

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com