

氧烯洛尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_A7\\_E7\\_83\\_AF\\_E6\\_B4\\_9B\\_E5\\_c22\\_311916.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B0_A7_E7_83_AF_E6_B4_9B_E5_c22_311916.htm) 药品名称氧烯洛尔 英文名称Oxprenolol [ ] 类别 受体阻断药制剂常用其片剂

，每片20mg；40mg；80mg。缓释片：每片80mg；160mg。复方制剂有TRASITENSIN（含氧烯洛尔及氯噻酮）

、TRASIDREX（含氧烯洛尔及环戊噻嗪）、TREPRESS（含氧烯洛尔、胍屈嗪及氢氯噻嗪）。药理及应用本品为无选择性的 阻断剂，具有内在交感活性及膜稳定性。其阻断作用与普萘洛尔相似。另外，它还可降低血浆肾素活性、减少肾血流量及肾小球滤过率。口服自胃肠吸收，吸收率90%，1~2小时后血药浓度达峰值，与血浆蛋白结合率为80%，在肝中被代谢，由肾排泄。t<sub>1/2</sub>为1~3小时。可通过血脑屏障及胎盘，也可出现于乳汁。不良反应不良反应与普萘洛尔同，但可偶见血小板降低。用法用量可用于高血压，口服，开始时80mg / 次，1日2次，如疗效不满足，可于1~2周逐渐增量，如与利尿药合用时，较适宜的剂量为80~320mg / 日，如单独使用时，1日剂量不宜超过480mg。也可用于心绞痛，口服，40~160mg / 次，1日3次。也用于心律失常，口服，20~40mg / 次，1日3次；必需时可按病人情况增加剂量。于紧急情况下，可以10~20分钟间隔缓慢静注，1次1~2mg，1~2次。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)