

特拉唑嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_89_B9_E6_8B_89_E5_94_91_E5_c22_311920.htm 药品名称特拉唑嗪药物别名（四喃唑嗪、高特灵、降压宁、HEITRIN，HYTRINEX，HYTRIN，VASOCARD）英文名称Terazosin〔 〕类别降压药性状常用其盐酸盐，为白色或微黄白色结晶性粉末；无臭。较难溶于冰醋酸或水，难溶于甲醇、乙醇或氯仿，极难溶于无水醋酸，在丙酮或乙醚中几乎不溶。制剂片剂：每片0.5mg；1mg；2mg；5mg；10mg。分子式成分药理及应用为选择性突触后 α_1 受体阻滞药，其降压作用与哌唑嗪相似，但持续时间较长。它还可以降低血浆总胆固醇、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白及提高高密度脂蛋白。此外，在体实验表明，它能抑制去羟肾上腺素所致的前列腺组织痉挛，从而可以改善前列腺肥大患者的尿流动力学及临床症状。本品口服后吸收良好，生物利用度约90%。口服后1小时血药浓度达峰值。血浆蛋白结合率为90%~94%。主要在肝内代谢。 $t_{1/2}$ 约12小时。适应症可用于高血压，也可用于前列腺肥大。用法用量口服：开始时，1次不超过1mg，睡前服用，以后可根据情况逐渐增量，一般为1日8~10mg；1日最大剂量20mg，用于前列腺肥大，1日剂量为5~10mg。注意事项与哌唑嗪同，但首剂现象较少。常见的不良反应为头痛、头晕、乏力、鼻塞等。严重肝、肾功能不全患者禁用。12岁以下儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com