

托西溴苄铵 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_89_98_E8_A5_BF_E6_BA_B4_E8_c22_311927.htm 药品名称托西溴苄铵
英文名称Bretylum Tosilate#093. 类别抗心律失常药制剂注射液
：2ml：0.25g。药动学口服吸收虽快但不完全，也不规则。
肌注及静注后20～120min起效。作用维持6～9h。约90%以原形经肾排出， $T_{1/2}$ 约9.8h(4～17h)。血液透析可清除本品。适应症复发性室性心动过速与室颤。不良反应常见低血压，静注过快时发生恶心及呕吐。较少见有心动过缓、心律失常、心绞痛发作、腹泻及腹痛、过敏反应、头晕、头痛等。相互作用可增加洋地黄甙毒性。奎尼丁或普鲁卡因胺与本品合用相互拮抗。合用肾上腺素，去甲肾上腺素及多巴胺可使血压明显升高。三环类抗抑郁药可对抗连续用本品产生的血管扩张及血压下降作用。用法用量治疗室颤，紧急情况可不必稀释，5mg/kg快速静脉注射，如室颤仍持续，每15～30min注射10mg/kg，一日总量不超过30mg/kg。治疗室性心动过速：0.5g用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液50ml稀释后静滴10～30min以上。静脉滴注，稀释后以每分钟0.5mg～1mg速度滴入或5mg～10mg/kg，3～4次/日，缓慢静滴；肌肉注射，5mg～10mg/kg肌注，必要时1～2h后重复一次，然后以每6～8h一次维持治疗。极量：每日30mg/kg。注重事项妊娠C类。本品应依肾功能情况调整剂量。低血压时禁用本品。肾功能障碍、主动脉狭窄、肺动脉高压及其他有心排出量减低的情况慎用。为减少不良反应，最好以5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液稀释至40～50ml，静注10～20min。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com