

盐酸利多卡因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E5_88_A9_E5_c22_311929.htm 药品名称盐酸利多卡因
药物别名赛罗卡因、利舒卡 Xylocaine 英文名
称LidocaineHydrochloride#093. 类别抗心律失常药制剂注射液
：5ml：0.1g、20ml：0.4g。分子式成分药理毒理本品为酰胺类
局麻药及抗心律失常药。能阻断神经纤维传导，抑制心脏异位
节律点的自律性。药动学静脉注射后作用可持续10
~ 20min，PB约为70%，心肌中药物浓度为血药浓度的3倍。
主要在肝内脱乙基生成具活性的单乙基甘氨酸二甲苯胺，再
生成甘氨酸二甲苯胺而灭活。T1/2 约1~2h。血液透析不能
清除本品。适应症因急性心肌梗死、外科手术、洋地黄甙中
毒等所致急性室性心律失常如室性早搏、室性心动过速、心
室颤抖等。不良反应常见中枢神经系统症状如血药浓度为3
~ 5(g/ml时，出现头晕、嗜睡、感觉异常、欣快感与血药浓度
有关。血药浓度在6~10(g/ml时，出现情感分离，感觉麻木（
常在口周）、意识模糊、定向障碍、肌肉颤抖、烦躁不安、
甚至精神错乱、癫痫发作；少数有变态反应，偶见窦性过缓
，房室阻滞等心脏毒性。相互作用与奎尼丁、普鲁卡因胺、
美西律或妥卡尼合用可增强其毒性，可引起窦律停止。合用
苯妥英钠可增加中枢的毒副作用，西咪替丁、普萘洛尔等可
升高本品血浆浓度。用法用量静脉注射：50mg~100mg/次 或
每次1mg~2mg/kg，20~40min后可重复注射，剂量减半。见
效后改为100mg静脉滴注。注重事项妊娠B类。对本品过敏、
房室或室内传导阻滞、有癫痫病史、严重肝功能不全、青光眼
、尿潴留、心力衰竭及休克者禁用。老年人及肝功能不全者

应减量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com