

泮托拉唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_E6\\_B3\\_AE\\_E6\\_89\\_98\\_E6\\_8B\\_89\\_E5\\_c22\\_311930.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022_E6_B3_AE_E6_89_98_E6_8B_89_E5_c22_311930.htm) 药品名称泮托拉唑  
药物别名潘美路、泰美尼克 Panmeilu、Enteric-Coated 英文名称 pantoprazole 类别抗酸药及治疗消化性溃疡病药制剂片剂  
：40mg/片。分子式成分化学名：5-二氟甲氧基-2-{ [ 3 , 4-二甲氧基-2-吡啶基)甲基 ] 亚磺酰基}-1H-苯并咪唑钠盐-水合物。  
。药理毒理本品通过特异性地作用于胃粘膜壁细胞，降低壁细胞中的H /K ATP酶的活性，从而抑制胃酸的分泌。与奥美拉唑和兰索拉唑相比，本品对细胞色素P450依靠酶的抑制作用较弱。药动学泮托拉唑钠肠溶片口服吸收不规则，滞后时间达2.46h，Tmax为3.35h，血浆半衰期为1.18h，血浆蛋白结合率为92%，其体内过程符合一级吸收双室模型。其生物利用度在75%以上，主要在肝脏代谢，但与细胞色素P450很少相互作用；经肾脏消除，大约80%以代谢产物的形式经尿排泄，血浆清除率为11L/h。适应症十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变、复合性胃溃疡及所致急性上消化道出血。不良反应偶见头晕、失眠、嗜睡、恶心、腹泻、便秘、皮疹和肌肉疼痛。大剂量使用时可出现心律不齐，转氨酶升高，肾功能改变，粒细胞降低。用法用量40 mg，每日1-2次静脉滴注。临用前将10 mL专用溶剂注入冻干粉小瓶内，再将溶解后的液体加入100 mL氯化钠注射液中稀释后给予，13-50分钟内滴完。注意事项对本药过敏者，哺乳期妇女及孕妇禁用。当怀疑胃溃疡时，应首先排除癌症的可能性，因为本药的治疗可减轻其症状，从而延误诊断。肝肾功能不全者慎用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com