

阿莫沙平 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_98_BF_E8_8E_AB_E6_B2_99_E5_c22_311944.htm 药品名称阿莫沙平药物别名氯氧平，氯哌氧，Demolox，Moxadil，Asendin 英文名称Amoxapine 类别抗抑郁症药制剂片剂：每片50mg；100mg；150mg。分子式成分药理及应用本品为二苯并氧氮三环类抗抑郁药，与丙米嗪相比，具有相似的抗抑郁作用，但起效快，对心脏毒性低，抗胆碱作用与镇静作用弱。本品可通过抑制脑内突触前膜对NA的再摄取（对5-HT的再摄取影响小），产生较强的抗抑郁与精神兴奋作用。口服后吸收迅速而完全，1~2小时达血药峰浓度，在肺、心、肾、脑、脾组织中浓度较高。组织内浓度比血浆浓度高10倍。经肝脏代谢为7-羟基阿莫沙平和8-羟基阿莫沙平，均有抗抑郁活性，其 $t_{1/2}$ 分别为6.5小时和30小时。大部分代谢产物与葡萄糖醛酸结合，最后从肾脏排出，少量自粪便排出。本品适用于治疗各型抑郁症，对其它抗抑郁药治疗无效的内源性抑郁症病人亦有效，但对精神病性抑郁症疗效差。用法用量口服：开始每次50mg，每日3次，以后渐加量至每次100mg。严重病例可增至每日600mg。注重事项（1）不良反应较轻，常见的有消化道反应：口干、便秘。偶见眩晕、嗜睡、肌震颤。长期大量应用时可见锥体外系症状。罕见心率轻度升高、体位性低血压。（2）禁用于严重心、肝、肾功能不良者。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com