

吗氯贝胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_90_97_E6_B0_AF_E8_B4_9D_E8_c22_311947.htm 药品名称吗氯贝胺 药物别名MANERIX，AURORIX 英文名称Moclobemide 类别抗抑郁症药制剂薄膜包衣片：每片150mg。分子式成分药理及应用本品为单胺氧化酶抑制剂（MAOI），通过可逆性地抑制A型单胺氧化酶（MAOA），而提高脑内去甲肾上腺素（NA）、多巴胺（DA）和5-羟色胺（5-HT）的水平，产生抗抑郁作用。与不可逆性MAOI比较，具有抑酶作用快，停药后MAO活性恢复快的特点。口服后吸收快，而完全，分布广。几乎全部自肝脏代谢，只有很少部分以原形自肾脏排出。t_{1/2}为1~3小时。因其代谢快，常需在开始治疗时对剂量进行调整。适用于内源性抑郁症、轻度慢性抑郁症、精神性或反应性抑郁症的长期治疗。用法用量口服：每日300mg，分次饭后服，可根据病情增减至每日150~600mg。老年人、肾功能衰退者可不调整剂量；严重肝功不良者，剂量可减至1/2~1/3。注重事项（1）本品不良反应较少，偶见血压升高、失眠和其它MAOI所见的不良反应。（2）服用本品时，应避免进食大量富含酪胺的食物，如干酪、酵母和大豆发酵制品。（3）与西咪替丁合用时，本品用量应减少一半，或从低剂量开始使用。（4）本品可增强芬太尼与布洛芬的作用，合用时应适当调整后两者剂量。（5）儿童暂不宜应用。（6）甲状腺功能亢进者、孕妇慎用，精神分裂症、急性精神紊乱和嗜铬细胞瘤患者禁用。（7）不可与哌替啶、可待因及5-HT摄取抑制剂合用；亦避免与麻黄碱、伪麻黄碱合用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

