

氟伏沙明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B0_9F_E4_BC_8F_E6_B2_99_E6_c22_311951.htm 药品名称氟伏沙明药物别名三氟戊肟胺，氟戊肟胺，Floxytral 英文名

称Fluvoxoxamine 类别抗抑郁症药制剂片剂：每片50mg

；100mg分子式成分药理及应用本品具有抗抑郁作用，通过抑制脑神经细胞对5-HT的再摄取，但不影响NA的再摄取。其优点在于既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用，亦不影响MAO活性，对心血管系统无影响，不引起体位性低血压。口服吸收快而完全，用药10天之内达血浆稳态血浓度。

经肝脏代谢，肾脏排泄， $t_{1/2}$ 为15~20小时。适用于治疗各类抑郁症相互作用本品可抑制普萘洛尔等经肝代谢的 β -受体阻断剂的肝脏代谢率，亦可降低华法林和经肝脏代谢的抗维生素K类抗凝血药的肝代谢，故需合用时，应注重减少后者的用量。

用法用量口服：每日100~200mg，分1~2次服，饭时或饭后服下。剂量可视病情调整，每日不应超过300mg。注重事项（1）本品耐受良好，常见的不良反应有困倦、恶心、呕吐、口干、过敏等，连续使用2~3周后可逐渐消失。（2）用于有自杀倾向的抑郁症患者时，应非凡注重护理。癫痫患者、孕妇应慎用。肝、肾功能不良者应减量，并严加监护。

（3）服用本品者应禁止驾驶车辆或操作机器。（4）治疗焦虑症、烦躁、失眠症时，如疗效不佳，可与苯二氮类合用，但禁止与MAOI合用。100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com