

茚达品 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_8C_9A_](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_8C_9A_E8_BE_BE_E5_93_81_c22_311957.htm)

[E8_BE_BE_E5_93_81_c22_311957.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_8C_9A_E8_BE_BE_E5_93_81_c22_311957.htm) 药品名称茚达品 英文名称

Indalpine 类别抗抑郁症药制剂片剂：每片50mg分子式成分

药理及应用本品为5-HT再摄取的抑制剂，通过抑制突触前膜

对5-HT的再摄取，提高突触间隙中5-HT的含量，促进突触间

的传递，产生抗抑郁作用。不影响其它递质的再摄取。口服

吸收快，1次服50mg。2小时后可达血药峰浓度，很快在脑内

达到平衡，在血液中到第3日才能达到平衡。主要通过肾脏排

泄， $t_{1/2}$ 为10小时。用于治疗各型抑郁症用法用量口服，每

日100~150mg，分2~3次，进餐时服。注重事项（1）本品常

见的不良反应有嗜睡、战抖（继续用药可减轻）、白细胞减

少，粒细胞减少，偶见ALT增高，停药后可恢复。（2）使用

本品过程中，要注重有自杀倾向的人及机械操作人员、驾驶

员，以防发生事故。（3）禁用于有白细胞减少、粒细胞缺

乏症病人，不应与影响白细胞的药物合用，亦不可与MAOI

合用。（4）有癫痫病史患者、妊娠期与哺乳期妇女慎用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com