

硫酸特布他林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E7_89_B9_E5_c22_311960.htm 药品名称硫酸特布他林 药物别名叔丁喘宁，间羟舒喘宁，间羟叔丁肾上腺素 英文名称Terbutaline Sulphate 类别 肾上腺素受体激动剂制剂片剂：2.5mg；注射液：1ml:0.25mg 分子式成分药理毒理本品是一种肾上腺素能激动剂。可选择性激动 β_2 -受体，而舒张支气管平滑肌、抑制内源性致痉挛物质的释放及内源性介质引起的水肿，提高支气管粘膜纤毛上皮廓清能力，也可舒张子宫平滑肌。药动学口服后30min起效，2~4h达最大效应，可持续5~8h，皮下注射可维持1.5~4h，气雾吸入经5~15min起效，0.5~1h达最大效应，持续4h左右。口服生物利用度为 $15 \pm 6\%$ ，约30分钟出现平喘作用。有效血药浓度为 $3 \mu\text{g/ml}$ ，血浆蛋白结合率为25%。2-4小时作用达高峰，持续4-7小时。Vd为 $1.4 \pm 0.4\text{L/kg}$ 。适应症支气管哮喘、喘息性支气管炎、肺气肿等。不良反应少数患者有头痛、手颤、心悸和胃肠道反应等。相互作用1.并用其他肾上腺素受体激动剂可使疗效增加，但不良反应也可能加重。2.并用茶碱类药可增加疗效，但心悸等不良反应也可能加重。3.非选择性 β 阻滞剂可部分或全部抑制该药的作用。用法用量口服：2.5mg~5mg/次，2~3次/日；儿童：3mg~6mg/日。皮下注射：0.25mg/次，每日最大量为1mg；儿童：0.05mg~0.1mg/日。注重事项对本品过敏者禁用。妊娠B类。高血压、冠心病、甲亢、糖尿病及妊娠患者慎用。1.少数病例有手指震颤、头痛、心悸及胃肠障碍。口服5mg时，手指震颤发生率可达20%-33%。2.甲状腺机能亢进、冠心病、高血压、糖尿病患者慎用。3.大剂量应用可

使有癫痫病史的患者发生酮症酸中毒。 4. 长期应用可形成耐药，疗效降低。 #093. 因本品可舒张子宫平滑肌，可抑制孕妇的子宫活动能力及分娩，应慎用。 #093. 12岁以下儿童与小儿的剂量尚未确立。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com