

右美沙芬〔PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_B3\\_E7\\_BE\\_8E\\_E6\\_B2\\_99\\_E8\\_c22\\_311961.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_8F_B3_E7_BE_8E_E6_B2_99_E8_c22_311961.htm) 药品名称右美沙芬〔  
药物别名美沙芬，右甲吗喃 英文名称Dextromethorphan 类别  
镇咳药性状氢溴酸盐为白色或类白色结晶性粉末，无味或微  
苦，溶于水、乙醇，不溶于乙醚。熔点125 左右。制剂片剂  
：每片15mg。糖浆剂：每20ml含15mg；每100ml含150mg。分  
子式成分药理及应用本品为吗啡类左吗喃甲基醚的右旋异构  
体，通过抑制延髓咳嗽中枢而发挥中枢性镇咳作用。其镇咳  
强度与可待因相等或略强。无镇痛作用，长期应用未见耐受  
性和成瘾性。治疗剂量不抑制呼吸。口服吸收好，15~30分  
钟起效，作用可维持3~6小时。血浆中原型药物浓度很低。  
其主要活性代谢产物3-甲氧吗啡烷在血浆中浓度高， $t_{1/2}$ 为5  
小时。主要用于干咳，适用于感冒、急性或慢性支气管炎、  
支气管哮喘、咽喉炎、肺结核以及其他上呼吸道感染时的咳  
嗽。相互作用与单胺氧化酶抑制剂并用时，可致高烧、昏迷  
，甚至死亡。贮存遮光密闭保存。用法用量口服，每次15  
~30mg，1日3~4次。注重事项偶有头晕、轻度嗜睡、口干、  
便秘等副作用。孕妇及痰多病人慎用，妊娠3个月内妇女及有  
精神病史者禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接  
下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)