

美西律 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_BE_8E_E8_A5_BF_E5_BE_8B_c22_311962.htm 药品名称美西律药物别名慢心律、脉律定，脉舒律，MEXITIL，K 1173 英文名称Mexiletine 类别抗心律失常药性状常用其盐酸盐，系白色或类白色结晶性粉末；几乎无臭，味苦。熔点200～204。在水或乙醇中易溶，在乙醚中几乎不溶。制剂片剂：每片50mg；100mg；250mg。胶囊剂：每胶囊50mg；100mg；400mg。分子式成分药理及应用属Ⅲ类抗心律失常药。具有抗心律失常、抗惊厥及局部麻醉作用。对心肌的抑制作用较小。主要用于急、慢性室性心律失常，如室性早搏、室性心动过速、心室颤抖及洋地黄中毒引起的心律失常。用法用量（1）口服1次50～200mg，1日150～600mg，或每6～8小时1次。以后可酌情减量维持。（2）静注开始量100mg，加入5%葡萄糖液20ml中，缓慢静注（3～5分钟）。如无效，可在5～10分钟后再给50～100mg1次。然后以1.5～2mg/min的速度静滴，3～4小时后滴速减至0.75～1mg/min，并维持24～48小时。注意事项可有恶心、呕吐、嗜眠、心动过缓、低血压、震颤、头痛、眩晕等。大剂量可引起低血压、心动过缓、传导阻滞等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com