

溴苄铵 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_BA\\_B4\\_E8\\_8B\\_84\\_E9\\_93\\_B5\\_c22\\_311968.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_BA_B4_E8_8B_84_E9_93_B5_c22_311968.htm) 药品名称溴苄铵药物别名 甲苯磺酸溴苄乙铵，特兰新，DARENTHIN，BRETILAN 英文名称Bretylum〔 〕类别抗心律失常药性状常用其甲苯磺酸酯，为白色结晶性粉末熔点97~99℃。可溶于水、乙醇等。制剂注射液：每支0.25g（2ml）。片剂（糖衣片）：每片0.1g。分子式成分药理及应用属Ⅲ类抗心律失常药物。为抗肾上腺素药，能提高心室致颤阈，并能直接加强心肌收缩力，改善房室传导，适用于各种病因所致的室性心律失常，如频发性早搏、阵发性室性心动过速、心室扑动和颤抖，尤其对洋地黄所致阿-斯综合征效果较好。此外，对由于器质性心脏病、电解质紊乱、酸碱失去平衡或由于洋地黄、奎尼丁等药物中毒所引起的心律失常，也有一定疗效，为抗心律失常的较好药物。本品曾用于治疗高血压，但因口服吸收不完全且不规则，剂量难以把握，加之长时间服用易引起耐药性，疗效亦不及其他某些降压药，故已少用。用法用量静注或肌注：剂量为3~5mg/kg，静注时以5%葡萄糖液稀释后缓慢推注，在10~20分钟内注完。必要时，4~6小时后再用。也可在静注出现疗效后，以肌注维持。治疗洋地黄所致的阿-斯综合征：每日口服3次，每次0.1g，以后递增至有效量后，即以该剂量维持，但天天最高剂量不超过1.5g。注意事项（1）有时有胸闷、心慌、恶心、呕吐、腹部不适等反应，注射后可有暂时升压现象，但均较轻微，无须因此而停药。（2）钙离子可能与本品有拮抗作用，不宜合用。（3）因本品到达作用高峰较慢（用药后2~3小时），故宜尽早用药。 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)