

氯米帕明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B0_AF_E7_B1_B3_E5_B8_95_E6_c22_311978.htm 药品名称氯米帕明药物别名氯丙米嗪，安拿芬尼，Chlorimipramine，ANAFRANIL，Hydiphen 英文名称Clomipramine 类别抗抑郁症药性状白色或微黄色结晶性粉末；无臭，味苦；遇光色渐变黄。在冰醋酸或氯仿中极易溶解，在水或乙醇中易溶，在丙酮中微溶，在乙醚中几乎不溶。制剂片剂：每片10mg；25mg；50mg；100mg。胶囊剂：每胶囊10mg；25mg；50mg；75mg。缓释片：每片75mg。注射液：每支25mg（2ml）。分子式成分药理及应用本品为一安全可靠、起效迅速的抗抑郁药，通过抑制突触前膜对NA与5-HT的再摄取而产生抗抑郁作用，同时还有抗焦虑与镇静作用。口服吸收良好，1~2周可达稳态血浓度。经肝脏代谢，代谢产物去甲氯米帕明浓度比原药浓度高2倍。血浆蛋白结合率为97.6%， $t_{1/2}$ 为21小时。约70%自尿排出，30%自粪便排出。本品适用于治疗内源性、反应性、神经性、隐匿性抑郁症以及各种抑郁状态；伴有抑郁症的精神分裂症；强迫症、恐怖症；多种疼痛等。用法用量治疗抑郁症、强迫症：口服，开始一次25mg，1日3次（或服缓释片，75mg，每晚1次），1周内可渐增至最适宜的治疗量。1日最大剂量为250mg，小儿或青年患者日200mg。症状好转后，改为维持量，每日50~100mg（缓释片剂每日75mg）。肌注：开始25~50mg，以后增至每日100~150mg，症状好转后，改为口服维持量。静注：开始25~75mg，溶于250~500ml等渗盐水或5%葡萄糖注射液中，每日1次，在1.5~3小时内输完，最好每日早晨输。一般第1周见效，见效后再继

续滴注3~5天，然后改为口服维持量。老年患者，开始每日10mg，逐渐增加至每日30~50mg（约10天），然后改维持量。小儿：口服：每日10mg，10天后，5~7岁儿童增至20mg，8~14岁增至20~25mg，14岁以上增到50mg或按需要量，分次服用。治疗慢性病性疾病：每日约10~150mg，最好同时服用止痛剂。注重事项（1）主要不良反应有口干、出汗、眩晕、震颤、视力模糊、排尿困难、体位性低血压。偶见皮肤过敏、粒细胞减少。大剂量时可产生焦虑、心律不齐、传导阻滞、失眠等。罕见肝损伤、发热、癫痫发作。（2）严重心脏病、循环障碍、急性心梗、传导阻滞、低血压、青光眼、排尿困难、白细胞过低、对本品过敏者禁用。（3）癫痫患者及孕妇慎用。（4）服用本品期间，不宜饮酒或含酒精饮料。不得与单胺氧化酶抑制剂合用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com