

吡美诺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_90_A1_E7_BE_8E_E8_AF_BA_c22_311990.htm 药品名称吡美诺药物别名吡哌醇 英文名称Pirmenol 类别抗心律失常药制剂常用其片剂：每片50mg；100mg。注射液，每支50mg（2ml）。药理及应用本品属Ⅰa类抗心律失常药，其作用与奎尼丁相似。它还具有抗胆碱作用。口服后吸收迅速、完全，生物利用度80%~90%，服药后1小时左右达血药浓度峰值。与血浆蛋白结合率约85%。主要在肝被代谢，约30%以原形药物由肾排泄。 $t_{1/2}$ 为4~17小时。本品适用于各种原因引起的室性早搏、室性心动过速，对室上性心律失常也有效。尤对低钾所致的心律失常，疗效优于其他抗心律失常药。不良反应可能产生抗胆碱作用的不良反应，如口干、便秘、尿潴留等。在血浓度较高时可出现PR、QRS、QT间期延长、低血压、心功能抑制等。房室传导阻滞、心功能不全者慎用。用法用量口服，1次0.1~0.2g，1日2~3次。静注2.5mg/kg，于2分钟注入。静滴，每分钟2.5mg。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com