

盐酸胺碘酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E8_83_BA_E7_c22_312011.htm 药品名称盐酸胺碘酮
药物别名乙胺碘呋酮、胺碘达隆、安律酮、可达龙 Cardiolol
, Cordarone 英文名称AmiodaroneHydrochloride 类别抗心律失常药
制剂片剂，胶囊剂：0.1g、0.2g；注射液：3ml：0.15g。
药理毒理本品能选择性扩张冠状动脉血流量，同时减少心肌耗氧量，减慢心率，降低房室传导速度与 β -受体阻滞剂的效应相似。药动学口服吸收缓慢， T_{max} 约6~8h，4~7h起效，停药后可持续8~10日，生物利用度为30~50%。PB95%。静注5min起效，可持续20min~4h，本品主要在肝脏代谢， $T_{1/2}$ 为14~28日。本品效应取决于口服剂量与疗程，与本品或代谢物血药浓度无关。血液透析不能清除本品。适应症室性早搏、室性心动过速、房性早搏、室上性心动过速（尤伴有预激综合征），也用于心绞痛等。不良反应食欲不振，腹胀、恶心、便秘等胃肠道反应。偶有皮疹、痉挛。久服可致药物沉积于角膜，停药后可消失。少数可有光敏感或皮肤变色。本品可发生明显的窦性心动过缓。能干扰甲状腺功能，偶有甲状腺功能紊乱甲亢或甲减征象（可对症处理）。相互作用考来烯胺等可降低本品血药浓度。本品可增强地高辛等洋地黄甙、利多卡因、氟卡因、普鲁卡因胺、奎尼丁、华法林、苯妥英、环孢素、茶碱、甲氨蝶呤及光敏药物等的作用。与 β 阻滞剂、钙通道阻滞剂、洋地黄甙等合用易致心动过缓、窦律停止；与全身麻醉药合用易致心动过缓、低血压。用法用量成人，口服：0.2g/次，3次/日，1~2周后根据需要改为0.2g/次，1~2次/日维持。静脉推注：0.15g/次（

或3mg/kg) , 缓慢注射 ; 静脉滴注 : 5mg/kg。 注重事项妊娠C类。 孕妇、 哺乳期妇女慎用。 病窦综合征、 和 度房室传导阻滞、 心动过缓、 甲状腺疾病以及对本品或碘过敏者禁用。 应定期监测血压、 心电图等。 本品口服吸收和起效时间缓慢 , 不宜在时间内用过大剂量以免过量。 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com