

盐酸美西律 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E7\\_BE\\_8E\\_E8\\_c22\\_312014.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E7_BE_8E_E8_c22_312014.htm) 药品名称盐酸美西律  
药物别名慢心律，脉律定 Mexitil 英文名  
称Mexiletinehydrochloride 类别抗心律失常药制剂片剂，胶囊  
：50mg、100mg；注射液：2ml：100mg。药理毒理本品具有  
局麻、抗惊厥及抗心律失常作用。抗心律失常作用与利多卡  
因相似，对心肌的抑制作用较小。药动学口服吸收完全，口  
服后30min起效，约持续8h，Tmax为2~3h，有效血浓度0.75  
~2(g/ml，中毒血药浓度与有效血浓度相近，为2(g/ml以上。  
主要经肝脏代谢，效部分以原形从尿中排出，乳汁亦有分泌  
。T1/2为10~13h，肾功能受损者延长。血液透析可清除本品  
。适应症急性和慢性室性早搏、室性心动过速。不良反应有  
恶心、呕吐、嗜眠、震颤、眼球震颤、复视、头痛、眩晕、  
发音困难、感觉异常等。偶见低血压、心动过缓或心律失常  
加重等。相互作用利福平、苯巴比妥、苯妥英钠等肝微粒体  
代谢酶诱导剂以及使尿液酸化药可降低本品血药浓度。西咪  
替丁、使尿液碱化药可升高本品血浓度。咖啡因、茶碱以及  
其他抗心律失常药等可增强本品作用。阿托品可延迟本品的  
吸收，但不影响吸收总量，而吗啡使本品吸收延迟并减少。  
止吐药如甲氧氯普胺可增加本品的吸收速度。用法用量成人  
，口服：150mg~250mg/次，3~4次/日，以后可酌情减量维  
持，极量1200mg/日。静注：开始100mg，用葡萄糖注射  
液20ml稀释后，缓慢推注。如无效，可在5~10min内再  
给50mg~100mg，然后以1.5mg~2mg/min的速度静滴，3~4h  
后滴注速度减至0.75mg~1mg/min，维持24~48h。 注重事项

妊娠C类。孕妇、哺乳期妇女慎用。 和 度房室传导阻滞、心源性休克以及对本品过敏者禁用。用药期间，应监测血压、心电图、心功能、血清钾等。如心电图P～R间期延长、QRS波增宽或原有心律失常加剧，应立即停药。在换用其他抗心律失常药前，应停药至少一个半衰期。静注用药仅限于其他药抢救无效者。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)