

异成巴比妥 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_BC_82_E6_88_90_E5_B7_B4_E6_c22_312039.htm 药品名称异成巴比妥
药物别名阿米妥，AMYTAL 英文名称Amobarbital 类别巴比妥
类性状白色结晶性粉末；无臭，味苦。在乙醇或乙醚中易溶，
在氯仿中溶解，在水中极微溶解，在氢氧化钠或碳酸钠溶液
中溶解。熔点155~158.5。制剂片剂：每片0.1g。分子式
成分药理及应用作用与苯巴比妥相似，但作用快而持续较短，
为中效类催眠药。口服或钠盐肌注均易自给药部位吸收。
主要经肝脏代谢，而后由肾脏排出。用于镇静、催眠、抗惊厥。
用法用量（1）口服：常用量，1次0.1~0.2g；极量，1
次0.2g，1日0.6g。肌内或缓慢静脉注射，1次0.1~0.25g；极量
，1次0.25g，1日0.5g。（2）镇静：0.02~0.04g，1日2~3次。
（3）催眠：0.1~0.2g，于睡前服用，适用于难入睡者。（4
）抗惊厥：静注或肌注其钠盐0.3~0.5g。注重事项（1）可致
依赖性。（2）严重肝功能不全者禁用。（3）中毒解救同苯
巴比妥。（4）注射剂用注射用水配成5%~10%的溶液，现
配用。静注宜缓慢。给药过程中应注重观察病人的呼吸及肌
肉松弛程度，以恰能抑制惊厥为宜。100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com