

胺碘酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_83_BA_E7_A2_98_E9_85_AE_c22_312063.htm 药品名称胺碘酮药物别名乙胺碘呋酮，安律酮，可达龙，ATLANSIL，SEDACORON，CORDARONE 英文名称Amiodaron 类别抗心律失常药性状常用其盐酸盐，为白色至微带黄色结晶性粉末；无臭，无味，熔点158~162。在氯仿中易溶，在乙醇中溶解，在丙酮中微溶，在水中几乎不溶。制剂片剂：每片0.2g。胶囊剂：每胶囊0.1g；0.2g。注射液：每支150mg（3ml）。分子式成分药理及应用原为抗心绞痛药，具有选择性冠脉扩张作用，能增加冠脉血流量，降低心肌耗氧量。近年发现具有抗心律失常作用，属Ⅲ类药物，能延长房室结、心房和心室肌纤维的动作电位时程和有效不应期，并减慢传导。临床适用于室性和室上性心动过速和早搏、阵发性心房扑动和颤抖、预激综合征等。也可用于伴有充血性心力衰竭和急性心肌梗塞的心律失常患者。对其他抗心律失常药如雨吡胺、维拉帕米、奎尼丁、受体阻滞剂无效的顽固性阵发性心动过速常能奏效。此外，还用于慢性冠脉功能不全和心绞痛。用法用量口服：1次0.1~0.2g，1日1~4次。或开始每次0.2g，1日3次，饭后服；3天后改用维持量，每次0.2g，1日1~2次。注意事项（1）主要有胃肠道反应（食欲不振、恶心、腹胀、便秘等）及角膜色素沉着（约占20~90%），偶见皮疹及皮肤色素沉着，但停药后可自行消失。（2）房室传导阻滞、心动过缓甲状腺功能障碍及对碘过敏者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com