

硫糖铝 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E7\\_B3\\_96\\_E9\\_93\\_9D\\_c22\\_312067.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_A1_AB_E7_B3_96_E9_93_9D_c22_312067.htm) 药品名称硫糖铝 药物别名胃溃宁，ULCERLMIN，ULCERBAN 英文名称Sucralfate 类别抗酸药及治疗消化性溃疡病药 性状白色或类白色粉末；无臭，几乎无味；有引湿性。在水中、乙醇或氯仿中几乎不溶，在稀盐酸或稀硫酸中易溶，在稀硝酸中略溶。制剂片剂：每片0.25g；0.5g。胶囊剂：每胶囊0.25g。胃康宁片：内含硫糖铝和盐酸黄连素。每片0.25g。口服1次5片，1日3~4次，两餐之间服用。分子式成分 本品为蔗糖硫酸酯的碱式铝盐。药理及应用能与胃蛋白酶络合，抑制该酶分解蛋白质；并能与胃粘膜的蛋白质（主要为白蛋白及纤维蛋白）络合形成保护膜，覆盖溃疡面，阻止胃酸、胃蛋白酶和胆汁酸的渗透、侵蚀，从而利于粘膜再生和溃疡愈合。治疗剂量时，胃蛋白酶活性可下降约30%。本品无抑制胃酸分泌、刺激粘膜再生及抗酸作用。服用本品后，仅2%~5%的硫酸二糖被吸收，并由尿排出。常用于胃及十二指肠溃疡。相互作用不宜与多酶片合用，否则两者疗效均降低。此由于多酶片中含有胃蛋白酶、胰酶和淀粉酶，其药理作用正与本品相拮抗，所含消化酶非凡是胃蛋白酶影响溃疡愈合。与西咪替丁合用时可能使本品疗效降低。贮存密闭、防潮。用法用量口服：每次1g，1日3~4次，饭前1小时及睡前服用。注重事项（1）不良反应发生率约为4.7%，其中主要有便秘（2.2%）。个别患者可出现口干、恶心、胃痛等，可与适当抗胆碱药合用。（2）治疗收效后，应继续服用数月，以免复发。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)