

獐牙菜苦甙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8D\\_90\\_E7\\_89\\_99\\_E8\\_8F\\_9C\\_E8\\_c22\\_312124.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_8D_90_E7_89_99_E8_8F_9C_E8_c22_312124.htm) 药品名称獐牙菜苦甙  
英文名称swertiamarin 类别胃肠解痉药性状白色片状结晶，味苦，在空气中略有吸湿性。易溶于甲醇、乙醇，微溶于水，不溶于氯仿、石油醚。熔点111。制剂胶囊剂：每胶囊50mg；100mg；200mg。药理及应用本品对大鼠离体十二指肠、子宫、胆囊平滑肌以及胆管扩约肌的自主节律性活动均有抑制作用，并能对抗乙酰胆碱、去甲肾上腺素等对上述器官的兴奋作用。临床应用证实本品对胃肠道、胆道平滑肌痉挛性疼痛有明显的解痉镇痛作用，还有一定的镇静作用，且无过敏性和刺激性。口服吸收良好。动物实验结果，在组织中以肝、肾、胆囊中分布较多； $t_{1/2}$  0.6.07小时；48小时内尿中排出40.2%，粪便中排出21.0%。血浆蛋白结合率为49.7%。临床适用于胃肠痉挛、胃肠炎，肠蛔虫症，胆道蛔虫症、胆囊炎、胆石症及其它胆道疾患引起的疼痛。496例腹痛患者使用本品治疗，总有效率为88.3%。贮存密封于干燥处保存。用法用量口服：成人每次100~200mg，小儿每次5~7mg/kg。一般用药1次即可奏效，少数病例在4小时后可重复给药1次。注重事项少数病人有稍微口干、潮红、头昏、恶心、嗜睡，呕吐等反应，但不影响治疗，不经处理即能在短时间内消失。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)