

川芎嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_B7_9D_E8_8A_8E_E5_97_AA_c22_312126.htm 药品名称川芎嗪 别名Tetramethylpyrazine 英文名称Ligustrazine 类别防治心绞痛药 性状常用其盐酸盐或磷酸盐。其盐酸盐为白色或类白色结晶性粉末，有臭、味苦，熔点91℃，可升华。易溶于水，溶于乙醇、氯仿，极微溶于苯。磷酸盐不易升华，较为稳定。制剂片剂：糖衣片，每片含川芎嗪磷酸盐50mg。分子式成分为伞形科植物川芎（*Ligusticum wallichii*）的成分之一。现由人工合成。药理及应用具有抗血小板聚集的作用，并对已聚集的血小板有解聚作用；尚能扩张小动脉，改善微循环和脑血流，产生抗血栓形成和溶血栓的作用。由于磷酸盐比较稳定，易于保存，且口服也有效。适用于闭塞性血管疾病、脑血栓形成、脉管炎、冠心病、心绞痛等。对缺血性脑血管病的急性期、恢复期及其后遗症，如脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞、脑动脉硬化等均有较好疗效，能改善这些疾病引起的偏瘫、失语、吞咽困难、肢体麻木、无力、头痛、头晕、失眠、耳鸣、走路不稳、记忆力减退等症状。磷酸盐具有给药方便、见效快、疗效好、副作用少等优点。用法用量口服：磷酸盐片剂每次2片，1日3次，1个月为1疗程。肌注：盐酸盐注射液每次2ml，每日1~2次。磷酸盐注射液每次2~4ml，1日1~2次，15天为一疗程，宜缓慢推注。静滴：盐酸盐注射液每日1次2~4ml，或磷酸盐注射液每日1次，4~6ml，均稀释于5%~10%葡萄糖液（或氯化钠注射液、低分子右旋糖酐注射液）250~500ml中缓慢滴注，宜在3~4小时内滴完，10~15天为一疗程。注重事项口服偶有胃部不适、口干、嗜睡

等，饭后服用可避免或减少副作用。注射一般无明显毒副作用。对脑出血及有出血倾向的患者忌用；对少量出血与闭塞性脑血管病鉴别诊断困难时应慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com