

双氯非那胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_8F_8C_E6_B0_AF_E9_9D_9E_E9_c22_312127.htm 药品名称双氯非那胺
药物别名双氯磺酰胺 英文名称Diclofenamide 类别低效利尿药
制剂片剂：25mg 药理及应用作用较乙酰唑胺缓慢、持久。因化学结构中含有二个磺酰胺基团，故对碳酸酐酶的抑制较强。除抑制Na、K再吸收外，亦增加Cl的排出，故代谢性酸血症的发生较慢。1小时起效，2~4小时作用达高峰，持续6小时，主要用于治疗各型青光眼（开角型、闭角型及继发性青光眼），尤其适用于对乙酰唑胺有耐药性的患者
用法用量开始时1次服100~200mg，12小时1次。维持量：25~50mg，1日25~150mg
注意事项（1）可有眩晕、厌食、恶心、嗜睡、手足麻木感等反应。（2）疗程不宜过长，以免引起代谢性酸血症及低血钾症。（3）肾与肾上腺皮质功能严重障碍者忌用。（4）肝、肾功能不全者慎用
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com