

东莨菪碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_9C\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E4_B8_9C_E8_8C_9B_E8_8F_AA_E7_c22_312137.htm)

[E8\\_8C\\_9B\\_E8\\_8F\\_AA\\_E7\\_c22\\_312137.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E4_B8_9C_E8_8C_9B_E8_8F_AA_E7_c22_312137.htm) 药品名称东莨菪碱  
药物别名亥俄辛 英文名称Scopolamine 类别胃肠解痉药药理毒

理本品为外周抗胆碱药，除具有平滑肌解痉作用外，尚有阻滞神经节及神经肌肉接头的作用，但对中枢的作用较弱。能选择性地缓解胃肠道、胆管及泌尿道平滑肌痉挛和抑制蠕动

，而对心脏、瞳孔及唾液腺的影响很小，对呼吸中枢有兴奋作用。抗眩晕及抗震颤麻痹作用均较阿托品强，并有显著的镇静作用。适应症麻醉前给药，治疗震颤麻痹症、晕动病以及极重型流脑呼吸衰竭、感染中毒性休克等。

不良反应1 可出现口干，心律加快、视力调节障碍、嗜睡、心悸、面部潮红、恶心、呕吐、眩晕及头痛等。2 青光眼、前列腺肥大所致排尿困难、严重心脏病、器质性幽门狭窄或麻痹性肠梗阻病人禁用。乳幼儿、小儿慎用。3 如过量可引起谵妄、激动不安甚至惊厥、呼吸衰竭乃至死亡，可用拟胆碱药对症处理。

用法用量口服，10mg～20mg/次，3～5次/日。1岁以上儿童，5mg～10mg/次，3次/日。婴儿，5mg/次，3次/日。肌注、静注或静脉滴注，20mg/次，间隔20～30分钟可再用20mg。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)